

# JAUNDZIMUŠĀ REANIMĀCIJAS PROTOKOLS

Jaundzimušais \_\_\_\_\_ meitene / zēns. Vēsture Nr \_\_\_\_\_

Dzimis \_\_\_\_\_ plkst \_\_\_\_\_

Dzimšanas svars \_\_\_\_\_ Gestācijas nedēļas + dienas \_\_\_\_\_

## 1. Jaundzimušā novērtējums pēc Apgares skalas

Laiks pēc dzimšanas	Sirdsarbība	Elpošana	Ādas krāsa	Muskuļu tonuss	Refleksi	Novērtējums ballēs
1. minūte						
5. minūte						
10. minūte						

## 2. Asins gāzes :

Nabas artērija pH \_\_\_\_\_ pCO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ pO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ BE \_\_\_\_\_

Nabas vēna pH \_\_\_\_\_ pCO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ pO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ BE \_\_\_\_\_

Kapilārās/venozās asinis Plkst: \_\_\_\_\_  
pH \_\_\_\_\_ pCO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ pO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_ BE \_\_\_\_\_

Laktāts \_\_\_\_\_ mmol/l

3. Augļūdeņu raksturojums: gaiši  mekoniāli  asiņaini

## 4. Reanimācijas pasākumi:

A. Augļūdeņu atsūkšana: Jā  Nē

Atsūkšana no trahejas: Jā  Nē

### B. Pozitīva spiediena ventilācija:

Elpināšana ar masku-maisū: no \_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_ minūtei, FiO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_

Elpināšana ar T-veida ierīci: no \_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_ minūtei

PIP \_\_\_\_\_ PEEP \_\_\_\_\_ cmH<sub>2</sub>O

T<sub>i</sub> \_\_\_\_\_ sek \_\_\_\_\_ reizes

FiO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_

Intubācija: \_\_\_\_\_ dzīves minūtē

Intubācijas caurulītes izmērs: Ø 2,0 mm Ø 2,5 mm Ø 3,0 mm Ø 3,5 mm Ø 4,0 mm

Intubācijas caurulītes ievades dziļums: \_\_\_\_\_ cm

C. Netiešā sirds masāža: no \_\_\_\_\_ dzīves minūtes, veikta \_\_\_\_\_ minūtes

D. Medikamenti: S.Adrenalinu 0,01% \_\_\_\_\_ ml/kg \_\_\_\_\_ reizes

S.Natrii Chloridi 0,9% \_\_\_\_\_ ml/kg \_\_\_\_\_ reizes

## 5. Piezīmes, komentāri:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Paraksts (spiedogs): \_\_\_\_\_