

## Bilirubīna līmeņu izvērtēšanas un rīcības tabula.

Taktika atkarībā no bilirubīna līmeņa iznēsātiem jaundzimušajiem, kas dzimuši  $\geq 38$  gestācijas nedēļās.

Vecums (stundās)	Bilirubīna līmenis (micromoli/litrā)			
0	–	–	> 100	> 100
6	> 100	> 112	> 125	> 150
12	> 100	> 125	> 150	> 200
18	> 100	> 137	> 175	> 250
24	> 100	> 150	> 200	> 300
30	> 112	> 162	> 212	> 350
36	> 125	> 175	> 225	> 400
42	> 137	> 187	> 237	> 450
48	> 150	> 200	> 250	> 450
54	> 162	> 212	> 262	> 450
60	> 175	> 225	> 275	> 450
66	> 187	> 237	> 287	> 450
72	> 200	> 250	> 300	> 450
78	–	> 262	> 312	> 450
84	–	> 275	> 325	> 450
90	–	> 287	> 337	> 450
96+	–	> 300	> 350	> 450
Darbība	↓	↓	↓	↓
	Atkārtoti nosaka bilirubīna līmeni pēc 6–12 stundām	Apsver fototerapijas uzsākšanu un atkārtoti nosaka bilirubīna līmeni pēc 6 stundām	Uzsāk fototerapiju	Veic asins apmaiņas operāciju, ja vien tās sagatavošanās laikā bilirubīna līmenis nav nokritis zem šī sliekšņa



National Institute for  
Health and Clinical Excellence

© 2010 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists